

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Abonnement annuel :

Edition A ou B : 170 F.

Edition A + B : 323 F.

ÉDITION GÉNÉRALE - GRANDES CULTURES

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

- 1 -

BULLETIN n° 28 du 16 octobre 1986

CEREALES D'HIVER : Situation "pucerons" sérieuse
en Haute-Marne, Aube et secteurs
limitrophes.

COLZA : - nouvelles captures de charançons
du bourgeon
- déformation de feuilles sur
Bienvenu.

CE MESSAGE EST CONSULTABLE SUR MINITEL DEPUIS LE 16 OCTOBRE.

CEREALES D'HIVER

Stades par département pour les semis les
plus précoces :

Blé : 1 feuille (08 et 51)
1 à 2 feuilles (10 et 52).

Orge : 1-2 feuilles (08 et 51)
2 à 3 feuilles (10 et 52).

Dans l'ensemble, levée homogène et vigoureuse.

PUCERONS et JAUNISSE NANISANTE

Les infestations de pucerons sont très
variables selon les régions et les parcelles.
Nous vous rappelons que les **orges** et les
blés sont concernés par la jaunisse nanisante.

Les vols à la tour de piégeage continuent.
Le pouvoir virulifère des pucerons n'étant
pas connu actuellement, nous vous conseillons
de considérer que ces insectes sont porteurs
du virus.


Situation pucerons/département d'après les
informations issues de notre réseau d'observa-
teurs (en % de pieds infestés).

Ardennes :

Asfeld	:	5 %
Avançon	:	0 %
Landreville-Bayonville	:	premiers pucerons aillés

Marne : 7 parcelles

Bétheny	:	0%
Fismes	:	5%
Gueux	:	0%
St Etienne/Suippe	:	4%
Suippes	:	4%
Ville en Tardenois	:	0%
Vitry le François	:	fortes populations.



Le seuil d'intervention (1 à 2 pieds
touchés sur 10) est atteint en Haute-Marne
et dans l'Aube.

Dans la Marne et les Ardennes, les popula-
tions sont plus faibles (sauf en Sud Marne,
Perthois).

Les situations les plus touchées sont
les semis précoces, à proximité de maïs ou
de repousses.

Surveiller particulièrement les champs
isolés et les petites parcelles.

Préconisation :

Haute-Marne et Aube : Les parcelles
non protégées sont à traiter rapidement.
N'oubliez pas que la protection doit être
renouvelée si une nouvelle feuille est sortie
depuis votre traitement et en cas de réinfesta-
tion.

Marne et Ardennes : Une visite rapide de vos parcelles s'impose. Les populations semblent particulièrement élevées en limite de l'Aube et de la Haute-Marne.

Si le seuil d'intervention n'est pas atteint, attendez le stade 2 feuilles.

Bien observer les pucerons : Vu la faible taille des pucerons, il est souvent nécessaire d'arracher les pieds et de bien écarter les feuilles pour pouvoir les observer.

COLZA

Stades : 4 à 7 feuilles pour les plus précoces.

CHARANCON du BOURGEON TERMINAL

De nouvelles captures en cuvette jaune entre le 8 et le 15/10.

Tableau des captures cumulées du 8 au 15 octobre 1986 des charançons du Bourgeon terminal. Situation par département.

08 : ATTIGNY : 1
CHARLEVILLE MEZIERES : 0
CHEVEUGES : 0
HAUTEVILLE : 1
SEMIDE : 0

10 : CHAMOY : 1
COUSSEGNEY : 11
LHUITRE : 1
LIGNOL le CHATEAU : 1

51 : AULNAY L'AITRE : 0
COURCY : 9
CUPERLY : 0
FERE-CHAMPENOISE : 0
MONTMORT-LUCY : 0
LES RIVIERES HENRUEL : 14
TOURS SUR MARNE : 0

52 : BIENVILLE : 0
DAMMARTIN/MEUSE : 0
LANGRES : 1
MARANVILLE : 0
SEMILLY : 0
VIVEY : 0

Préconisation :

* Ardennes : ne pas intervenir, sauf captures.

* Autres départements :

. Vous avez déjà traité : la rémanence des produits assure encore la protection de vos parcelles.

. Vous n'avez pas encore traité : intervenir 10 jours après la première capture en cuvette jaune.

. **Attention :** les microgranulés insecticides au semis ne protègent plus vos parcelles.

Seule la cuvette jaune permet de connaître le risque de votre parcelle. Nous vous rappelons que ce vol précoce avait déjà été noté en 1982, année à forte attaque.

DEFORMATION DE FEUILLES SUR BIENVENU

Sur la variété Bienvenu, des déformations de pieds sont observées en toutes régions.

Les informations suivantes nous ont été fournies par le sélectionneur RINGOT:

Ces symptômes sont d'origine génétique et accentués par la sécheresse et les températures élevées que nous connaissons actuellement.

. La majorité des pieds touchés devrait développer de nouvelles tiges. Seul un faible pourcentage de ces pieds pourrait disparaître.

. Ces déformations ne devraient pas avoir de répercussions sur le rendement.

Le S.R.P.V. ne dispose pas d'informations à ce sujet.

DERNIERE MINUTE : FORTES POPULATIONS DE PUCERONS DANS LE PORCIEN (08).

INSECTICIDES UTILISABLES CONTRE LES PUCERONS

Spécialités	Dose en l/ Ha
FASTAC	0,2 1
TALSTAR	0,075 1
NEXION 25	1,5 1
KARATE	0,15 1
CYMBUSH	0,2 1
KAFIL super	0,2 1
MASTOR	0,4 1
SHERPA 10	0,2 1
DECIS CE	0,3 1
SUMICIDIN 10	0,25 1
MAVRIK	0,2 1



Pour profiter des informations par MINITEL, appeler directement le n° 36.15. et faire le code EDIMK